





鎳中毒

- 鎳急性中毒常見於吸入有機鎳 Nickel carbonyl 所致，中毒症狀類似一氧化碳中毒，但合併有血糖及尿糖上升、噁心、嘔吐、頭痛、頭暈、失眠、躁動持續數小時、然後 12 小時 ~ 5 天沒症狀。隨之會有如肺炎般的胸悶、呼吸困難、咳嗽、心悸、流汗、虛弱及視力模糊。
- 誤飲鎳（二價無機鎳）污染的飲水或透析用水，會有噁心、嘔吐、頭痛、心悸、虛弱、腹瀉、呼吸短促、咳嗽等症狀；持續 1 ~ 2 天。
- 長期皮膚接觸會有過敏性皮膚炎、慢性呼吸道疾病、免疫機能異常、及癌症都可發生；常見於從事電鍍業者。

檢驗表單	重金屬檢驗單(CM-L502)	
檢驗項目	血中鎳	尿中鎳
參考範圍	3-7 $\mu\text{g}/\text{dl}$	2-4 $\mu\text{g}/\text{dl}$
採檢容器 及檢體量	 Li-Heparin tube 最低採檢量 4 ml	 S-Y urine Tube 最低採檢量 5 ml
採檢注意事項	避免凝血與溶血	1.請緊閉蓋子，避免外漏汙染。

	2.請確實將總尿量註明於檢驗單申請單上。
檢驗方法	Atomic Absorption Spectrometry
可送檢時間	星期一 ~ 星期五 08 : 00 ~ 17 : 00 (例假日休)
報告完成時間	不含例假日 · 14個工作天
院內分機	(04) 22052121 轉 7308

若有任何疑問 · 請不吝與我們聯絡
電話 : (04) 22052121 分機 7308
HE-17018